



Nivel	Características principales	Ejemplos clínicos / sociales	Intervenciones sugeridas
<input type="checkbox"/> Riesgo bajo	No hay evidencia de daño inmediato. Existen sospechas iniciales o indicadores leves. La persona mantiene cierta autonomía y red de apoyo.	Relato difuso o evasivo. Síntomas leves (insomnio, angustia). Tensión sin agresión reciente. Sin amenaza directa ni aislamiento extremo.	Registrar en historia clínica, contener emocionalmente, brindar información, concertar nueva consulta. Derivar a equipos territoriales. Evaluar periódicamente.
<input type="checkbox"/> Riesgo medio	Presencia sostenida de violencia que afecta la salud física, psíquica o social. Riesgo acumulativo. La persona puede mostrarse ambivalente frente a la ayuda.	Síntomas persistentes. Violencia psicológica o económica frecuente. Aislamiento progresivo. Dificultades para tomar decisiones.	Intervención interdisciplinaria. Plan de cuidado conjunto. Seguimiento clínico y psicosocial. Derivación acompañada. Articulación comunitaria.
<input type="checkbox"/> Riesgo alto	Peligro inminente para la vida, integridad física o emocional. Amenazas, uso de armas, episodios recientes de violencia grave.	Lesiones recientes o graves. Amenazas explícitas. Presencia de armas. Intentos de suicidio. Niños/as expuestos a violencia. Fracaso de medidas judiciales.	Activación urgente del protocolo. Posible internación por resguardo. Intervención inmediata de servicios sociales y justicia. Notificación obligatoria. Plan de seguridad.